

予防接種スケジュール(未就学児)

種類	ワクチン名	法令	標準的なスケジュール	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳1か月	1歳3か月	1歳6か月	2歳	3歳	1か月後	4歳	5~6歳就学前
				年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年
不活化	B型肝炎 (母子感染予防を除く)	定期	生直後~1歳未満 標準的には2~9か月 初回免疫後、1月後(27日以上) と6月後(139日以上)2回追加	生直後から		①	②			初回後 139日 以上 あけて	③					1歳 まで								
経口生	ロタウイルス (1価)	定期	生後6週~24週 4週以上あけて2回 1回目は14週6日まで推奨	6週 から		①	②			24週 まで														
	ロタウイルス (5価)		生後6週~32週 4週以上あけて3回 1回目は14週6日まで推奨	6週 から			①	②	③		32週 まで													
不活化	ヒブ	定期	生後2か月~5歳未満 3~8週間隔で3回 7~13月後に追加1回	2か月 から		①	②	③										④						5歳 まで
不活化	小児用肺炎球菌 (13価)	定期	生後2か月~5歳未満 4週以上あけて3回 60日以上あけて、且つ12~15 か月未満時に追加1回	2か月 から		①	②	③										④						5歳 まで
不活化	四種混合 (DPT-IPV)	定期	生後3~90か月 3~8週間隔で3回 6月以上あけて追加1回 標準的には12~18月空けて				①	②	③									④						7歳半 まで
不活化	三種混合(DPT)	任意	就学前に追加を推奨																					⑤
不活化	ポリオ	任意	就学前に追加を推奨																					⑤
生	BCG	定期	生後1歳まで 標準的には5~8か月未満 板橋区は個別接種						標準は 5~7か 月	①							1歳 まで							
生	MR (麻しん風しん)	定期	生後12~24か月未満 追加は就学始期1年前から												1歳 から	①				2歳 まで			就学 1年前	②
生	おたふくかぜ 板橋区一部公費	任意	MRと同時接種を推奨、2回目を 3歳から接種することあり												1歳 から	①				2歳 まで				②
生	水痘 (水ぼうそう)	定期	生後12~36か月未満 標準は生後12~15か月 3月以上あけて2回目 標準は6~12月あけて2回目												1歳 から	①		3か月 以上あ けて	②			3歳 まで		
不活化	日本脳炎	定期	生後6か月~ 標準は3~4歳未満に初回1回 1~4週あけて2回目 6月以上あけて追加1回						6か月 から										標準は 3歳 から	①	②	③	7歳半 まで	
不活化	インフルエンザ	任意	生後6か月~ 毎年10月から12月にかけて 13歳未満2回、2~4週あけて 13歳以上1回						6か月 から															

初回は14週6日まで
どちらか一方

MR、水痘、おたふくかぜと
同時接種で受けることもできます

接種間隔: 注射生ワクチンから注射生ワクチンは27日以上の間隔をあけて
定期接種 任意接種 一部公費
 ※日本小児科学会とNPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会作成の推奨スケジュールを参照して作成しています。

