

くん ちゃん 年 月 日 生まれ

# 予防接種スケジュール(未就学児)

記入日 年 月 日

種類	ワクチン名	法令	標準的なスケジュール	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳1か月	1歳3か月	1歳6か月	2歳	3歳	1か月後	4歳	5~6歳就学前
				年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年	年 / 年
不活化	B型肝炎(母子感染予防を除く)	定期	生直後~1歳未満 標準的には2~9か月 初回免疫後、1月後(27日以上) と6月後(139日以上)2回追加	生直後から		①	②			初回後139日以上あけて	③					1歳まで								
経口生	ロタウイルス(1価)	定期	生後6週~24週 4週以上あけて2回 1回目は14週6日まで推奨	6週から		①	②			24週まで														
	ロタウイルス(5価)		生後6週~32週 4週以上あけて3回 1回目は14週6日まで推奨	6週から		①	②	③			32週まで													
不活化	ヒブ	定期	生後2か月~5歳未満 3~8週間隔で3回 7~13月後に追加1回	2か月から		①	②	③							7か月以上あけて		④							5歳まで
不活化	小児用肺炎球菌(13価)	定期	生後2か月~5歳未満 4週以上あけて3回 60日以上あけて、且つ12~15か月未満時に追加1回	2か月から		①	②	③									④							5歳まで
不活化	四種混合(DPT-IPV)	定期	生後3~90か月 3~8週間隔で3回 6月以上あけて追加1回 標準的には12~18月空けて	2か月から		①	②	③									④							7歳半まで
不活化	三種混合(DPT)	任意	就学前に追加を推奨																					⑤
不活化	ポリオ	任意	就学前に追加を推奨																					⑤
生	BCG	定期	生後1歳まで 標準的には5~8か月未満 板橋区は個別接種						標準は5~7か月	①						1歳まで								
生	MR(麻しん風しん)	定期	生後12~24か月未満 追加は就学始期1年前から												1歳から	①				2歳まで			就学1年前	②
生	おたふくかぜ 板橋区一部公費	任意	MRと同時接種を推奨、2回目を3歳から接種することあり												1歳から	①				2歳まで				②
生	水痘(水ぼうそう)	定期	生後12~36か月未満 標準は生後12~15か月 3月以上あけて2回目 標準は6~12月あけて2回目												1歳から	①		3か月以上あけて	②			3歳まで		
不活化	日本脳炎	定期	生後6か月~ 標準は3~4歳未満に初回1回 1~4週あけて2回目 6月以上あけて追加1回						6か月から										標準は3歳から	①	②	③	7歳半まで	
不活化	インフルエンザ	任意	生後6か月~ 毎年10月から12月にかけて 13歳未満2回、2~4週あけて 13歳以上1回						6か月から															

米国等に転勤される場合がある場合には、2回目と3回目の間隔を4~5か月あけます

初回は14週6日までどちらか一方

MR、水痘、おたふくかぜと同時接種で受けることもできます

接種間隔:注射生ワクチンから注射生ワクチンは27日以上の間隔をあけて  
定期接種 任意接種 一部公費  
 ※日本小児科学会とNPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会作成の推奨スケジュールを参照して作成しています。

 ときわ台はしもと小児科アレルギー科  
 電話: 03-6454-5415 2023年04月版